

Conviver com o lúpus

Lúpus significa “lobo” em latim e, supostamente, tem esse nome por causa das lesões na pele que lembravam mordidas de lobo. É uma doença autoimune sistêmica: “sistêmica” porque pode afetar qualquer parte do corpo ou todo ele e “autoimune” porque é provocada pelo excesso de zelo do sistema imunológico, que ataca tecidos normais e saudáveis.

Os efeitos variadíssimos do lúpus dependem do alvo do sistema imunológico. Um de seus indicadores mais característicos é o eritema, mancha vermelha na pele em forma de borboleta que cobre as bochechas e o alto do nariz, que só aparece em um terço dos pacientes. Outros sintomas são lesões da pele em forma de disco, úlceras na boca ou no nariz, febre, fadiga, artrite, dor muscular, falta de ar e olhos secos. Na maioria, os sintomas vêm e vão em períodos de doença ativa (crises) e remissão.

A predisposição ao lúpus é hereditária, embora em geral sejam necessários fatores externos para provocar o surgimento da doença. Esses gatilhos variam de raios ultravioletas ao estresse, infecções (como herpes-zóster ou resfriado comum) e certos medicamentos (como as sulfas). Alguns casos do chamado “lúpus induzido por fármacos” somem quando se para de tomar o remédio. A maioria dos outros casos precisa ser controlada a vida inteira. Talvez por envolver hormônios e cromossomos sexuais, as mulheres são nove vezes mais afetadas que os homens.

Se você recebeu o diagnóstico de lúpus, tente reduzir a exposição aos gatilhos. Quando houver crises, medicamentos como corticosteroides e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem controlá-las. “Precisamos acalmar rapidamente o lúpus para minimizar a probabilidade de danos”, diz o Dr. David Isenberg, principal autor das diretrizes de controle do lúpus publicadas pela Sociedade Britânica de Reumatologia.

Os medicamentos têm os próprios efeitos nocivos - problemas digestivos com o uso prolongado de AINEs, osteoporose causada pelos esteroides -, de modo que o reumatologista precisará elaborar um regime sob medida com bom equilíbrio entre proteção e danos. Também é preciso marcar exames regulares a fim de tratar prontamente as complicações que surgirem. O lúpus precisa ser levado a sério, mas, com acompanhamento regular, obediência à terapia, apoio emocional e um estilo de vida saudável, a probabilidade de

sobrevida está a seu favor.

Fonte: Revista Seleções, janeiro de 2019, páginas 16 e 17.

01) Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto:

- (A) O lúpus é uma doença autoimune, provocada pelo excesso de zelo do sistema imunológico.
- (B) O lúpus apresenta vários sintomas e o mais característico chama-se eritema, que ataca mais da metade dos doentes.
- (C) A doença afeta bem mais as mulheres que os homens e hipotetiza-se que seja por envolver hormônios e cromossomos sexuais.
- (D) O lúpus tem predisposição hereditária, mas, em geral, alguns fatores externos podem desencadear a doença.

02) As palavras bochechas e gatilho possuem respectivamente:

- (A) 9 letras e 9 fonemas, 7 letras e 7 fonemas.
- (B) 8 letras e 8 fonemas, 8 letras e 8 fonemas.
- (C) 9 letras e 7 fonemas, 7 letras e 6 fonemas.
- (D) 7 letras e 9 fonemas, 6 letras e 7 fonemas.

03) Nas palavras remédio e vermelha temos respectivamente:

- (A) Ditongo e dígrafo.
- (B) Hiato e dígrafo.
- (C) Ditongo e ditongo.
- (D) Hiato e ditongo.

04) As palavras lúpus e imunológico são acentuadas por serem respectivamente:

- (A) oxítone e paroxítone.
- (B) paroxítone e proparoxítone.
- (C) proparoxítone e proparoxítone.
- (D) paroxítone e paroxítone.

05) Assinale a alternativa cuja crase seja justificada pelo mesmo motivo do trecho “obediência à terapia”:

- (A) permite às pessoas.
- (B) ele sai às vezes.
- (C) às sete horas.
- (D) contrário à lei.

06) Assinale a alternativa cujo trecho apresente um advérbio de intensidade:

- (A) ... as mulheres são nove vezes mais afetadas que os homens.
- (B) Lúpus significa “lobo” em latim e, supostamente, tem esse nome por causa das lesões na pele...
- (C) Talvez por envolver hormônios e cromossomos sexuais ...
- (D) ...medicamentos como corticosteroides e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem controlá-las.

07) O pronome oblíquo átono no período “Quando houver crises, medicamentos como corticosteroides e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem controlá-las.”, retoma qual termo do texto:

- (A) medicamentos.
- (B) crises.
- (C) exposição.
- (D) mulheres.

08) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelo termo em destaque no período “Os efeitos variadíssimos do lúpus dependem do alvo do sistema imunológico”.

- (A) Complemento Nominal.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Indireto.
- (D) Objeto Direto.

09) Em um grupo com 400 pacientes, 120 pacientes precisam de tratamento para a hipertensão, 80 precisam de tratamento dentário e 40 precisam de tratamento dentário e tratamento para hipertensão. Quantos pacientes deste grupo não precisam destes dois tratamentos?

- (A) 160.
- (B) 180.
- (C) 200.
- (D) 240.

10) A tabela a seguir informa o número de lesões graves em acidentes envolvendo motociclistas e suas respectivas probabilidades de ocorrência no município de Altamira:

Número de lesões graves	Probabilidade
1	37%
2	32%
3	23%
4	8%

Com base na tabela podemos afirmar que o número médio de lesões graves em acidentes envolvendo motociclistas é de:

- (A) 1,75 lesões.
- (B) 2,02 lesões.
- (C) 2,45 lesões.
- (D) 3,05 lesões.

11) O número de pessoas infectadas com HIV em um determinado município no ano de 2016 foi de 1400 pessoas, já no ano seguinte este número passou para 1610 pessoas. Se considerarmos que nos próximos dois anos o número de infectados deve crescer nesta mesma proporção percentual, vamos ter aproximadamente:

- (A) 1850 pessoas infectadas.
- (B) 2000 pessoas infectadas.
- (C) 2130 pessoas infectadas.
- (D) 2450 pessoas infectadas.

12) Um jogo consiste em lançar simultaneamente 5 dados (cubo com as faces numeradas de 1 a 6), vence a rodada quem fizer o maior número de pontos, somando os números que aparecem na face superior. Se em uma das rodadas um jogador fez 27 pontos. É correto afirmar que a premissa verdadeira é a letra:

- (A) A face com o número 5 pareceu 4 vezes nesta jogada.
- (B) O número 6 apareceu somente uma vez nesta jogada.
- (C) O número 3 apareceu duas vezes nesta jogada.
- (D) O número 2 não apareceu nesta jogada.

13) Sejam as sentenças abertas:

() Para que $2x^2 - 7x + 3 = 0$ seja verdadeira x é 3 ou $1/2$.

() A sentença $2x - 7 > 5$ é falsa para valores de $x < 6$.

() A sentença $x^2 + 3x + 6 \geq 0$ é verdadeira para qualquer número x pertencente ao conjunto dos inteiros.

Se classificarmos as sentenças como verdadeira(V) ou falsa(F), na ordem que

aparecem, a sequência correta é a letra:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.

14) Dados os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 6 \leq x \leq 20\} \text{ e}$$

$B = \{x \in \mathbb{R} / -3 < x \leq 18\}$ a operação $A - B$ pode ser representada por:

- (A) $[-3 ; 20]$
- (B) $]18 ; 20]$
- (C) $[6 ; 18[$
- (D) $] -3 ; 6]$

15) A proposição “ após o vendaval, a casa cai ou a casa não cai” é classificada na lógica matemática como:

- (A) Uma contingência.
- (B) Um silogismo.
- (C) Uma tautologia.
- (D) Uma equivalência.

16) O custo de produção de um item é dado pela expressão $C(x) = 1000 + 5x$ (x representa a quantidade de unidades produzidas) e o seu custo médio por item é dado pela razão entre o custo de produção e a quantidade de unidades produzidas. Se aumentássemos a quantidade de itens produzidos indefinidamente, o custo médio por item vai tender a:

- (A) 0.
- (B) 5.
- (C) 1.
- (D) 2.

17) De acordo com o histórico da região onde está o município de Marmeleiro/PR, originalmente esta região era habitada por índios:

- (A) Tupinambás.
- (B) Caigangues.
- (C) Guaranis.
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores.

18) Dentre os políticos abaixo, identifique aquele que NÃO foi Governador do Paraná:

- (A) Pedro Viriato Parigot de Souza.
- (B) Emilio Hoffmann Gomes.
- (C) Jayme Canet Júnior.
- (D) João Hosken Queiroz

19) Atualmente, ocupa o cargo de Ministro de Estado da Saúde:

- (A) Gilberto Occhi.
- (B) Arthur Chioro.
- (C) Luiz Henrique Mandetta.
- (D) Alexandre Padilha.

20) No município de Marmeleiro/PR, o servidor efetivo será aprovado no estágio probatório se sua média de desempenho for igual ou superior a:

- (A) 70% (setenta por cento).
- (B) 60% (sessenta por cento).
- (C) 50% (cinquenta por cento).
- (D) 80% (oitenta por cento).

21) Todas as alternativas abaixo apresentam as vacinas mais importantes para os profissionais da Odontologia, exceto:

- (A) Hepatites A, B e C.
- (B) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- (C) Tuberculose, Difteria e Tétano.
- (D) Gripe e Pneumonia.

22) “Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” A afirmativa acima se refere a qual princípio do SUS:

- (A) universalidade de acesso.
- (B) integração em nível executivo das ações de saúde.
- (C) preservação da autonomia.
- (D) integralidade de assistência.

23) Assinale a alternativa incorreta com relação ao ácido peracético:

- (A) bactericida, fungicida, virucida e esporicida.
- (B) efetivo na presença de matéria orgânica e apresenta rápida ação somente em altas temperaturas.
- (C) não forma resíduo tóxico e é efetivo na presença de matéria orgânica.
- (D) instável quando diluído. Corrosivo para alguns tipos de metais, ação que pode ser reduzida pela modificação do pH.

24) “Simplificação do índice CPO baseada na relação entre o índice e a porcentagem de indivíduos com pelo menos um dente permanente atacado pela cárie, determinada em pessoas de 6 a 15 anos. A estimativa

pode ser útil para estimar o índice em áreas de baixa prevalência de cárie, até o limite de 90%, que corresponde ao valor quatro para o índice CPO.” O texto acima se refere ao índice proposto por:

- (A) Klein e Palmer.
- (B) East e Pohlen.
- (C) Knutson.
- (D) Lilienthal e Andrews.

25) Assinale a alternativa incorreta com relação a contração de polimerização que ocorre em restaurações de resinas compostas:

- (A) A contração de polimerização ocorre quando os monômeros da resina, durante a polimerização se afastam estabelecendo, entre si, ligações covalentes, fazendo com que haja um aumento de volume.
- (B) A contração de polimerização pode ser minimizada ao se dar preferência às resinas de partículas menores, pois permitem uma melhor distribuição da carga, aumentando assim a porcentagem dessas na matriz orgânica.
- (C) A contração de polimerização pode ser minimizada através da técnica restauradora que propõe a realização de forramento para se diminuir o volume de resina, seja com ionômero de vidro ou resina flow.
- (D) Uma das tentativas de se diminuir a contração é a incorporação cada vez maior de partículas inorgânicas aumentando sua porcentagem em peso nas resinas compostas.

26) Assinale a alternativa incorreta com relação aos cimentos de ionômero de vidro convencionais e os ionômeros modificados por resina:

- (A) A liberação de flúor ocorre somente nos cimentos de ionômeros de vidro convencionais sendo quase nula nos ionômeros modificados por resina.
- (B) Os ionômeros modificados por resina possuem resistência superior aos convencionais, mostrando valores de duas a três vezes maiores, no caso de ionômeros restauradores.
- (C) Os ionômeros convencionais possuem um coeficiente de expansão térmica linear melhor que os ionômeros modificados por resina.
- (D) A adesividade dos ionômeros modificados por resina é superior à dos convencionais.

27) Todas as alternativas abaixo apresentam razões pelas quais o MTA se mostra melhor que o Hidróxido de cálcio para obliteração de exposição pulpar, exceto:

- (A) capacidade de promover menor resposta inflamatória.
- (B) capacidade de gerar maior analgesia.
- (C) capacidade antimicrobiana.
- (D) capacidade de formação dentinária.

28) A adequação do meio bucal constitui uma série de medidas utilizadas pelo cirurgião dentista para criar um ambiente favorável à paralisação da doença, por meio do controle dos fatores etiológicos. Isto pode ser alcançado através, exceto:

- (A) efetivo controle de placa por meio da sua evidenciação e remoção pelo profissional (profilaxia dental).
- (B) instituição de medidas no atendimento clínico como: orientação da dieta e da higiene bucal.
- (C) utilização racional dos fluoretos.
- (D) selamento das cavidades provisoriamente utilizando resinas compostas.

29) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao uso de fluoretos em Odontologia, exceto:

- (A) O Flúor incorporado sistemicamente no mineral dental tem um efeito muito limitado no controle da cárie.
- (B) Uma vez incorporada à estrutura dentária, o Flúor torna o dente menos solúvel aos ácidos produzidos no biofilme (placa) dental.
- (C) Os métodos preventivos baseados na utilização de Flúor promovem aumento de sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de des e remineralização.
- (D) Uso de métodos tópicos (bochechos, géis ou vernizes) em conjunto ao uso regular de dentifrício fluoretado tem pouco efeito adicional na redução de cáries.

30) Os ‘Streptococos do Grupo Mutans’ – EGM - são um grupo de microrganismos altamente cariogênicos pelas seguintes características, exceto:

- (A) Capacidade de colonizar a superfície dentária: Essas bactérias colonizam superfícies que não descamam (dentes, materiais restauradores, acrílicos). Portanto, só colonizam a cavidade bucal após a erupção dos dentes e em pacientes edentados, desde que portadores

de próteses.

(B) Capacidade acidúrica: sobrevivência do microrganismo em pH ácido, permitindo que o microrganismo desenvolva suas atividades metabólicas em ambientes de pH baixo, tais como sulcos e fissuras dos dentes.

(C) Capacidade acidogênica: a produção de ácido láctico é determinante fundamental para a patogenicidade, sendo responsável pela desmineralização do esmalte na etapa inicial da cárie. É um pré-requisito essencial para que um microrganismo seja considerado cariogênico.

(D) São bastonetes Gram positivos, anaeróbios facultativos e às vezes microaerófilos. Uma característica importante é a sua capacidade acidogênica e acidúrica e sua capacidade de realizar tanto o metabolismo oxidativo como fermentativo.

31) Todas as afirmativas abaixo apresentam corretas indicações para o aumento de coroa clínica, exceto:

(A) Dentes com inadequados espaços interoclusais, para que se consiga adequado procedimento restaurador.

(B) Dentes fraturados sem adequado remanescente periodontal.

(C) Facilitar a técnica de tratamento endodôntico.

(D) Minimizar a ocorrência de hemorragia gengiva.

32) Assinale a alternativa incorreta com relação às características de uma lesão gengival estabelecida:

(A) Na lesão estabelecida clássica, observa-se grande número de plasmócitos maduros situados principalmente na porção coronária do tecido conjuntivo, bem como ao redor dos vasos.

(B) A perda de colágeno ocorre nas direções lateral e apical, à medida que o infiltrado celular sofre expansão, resultando em espaços destituídos de colágeno que se estendem mais profundamente nos tecidos, os quais se encontram então disponíveis para a infiltração dos leucócitos.

(C) Neste período, o epitélio dentogengival continua a proliferar e as cristas se prolongam no sentido do tecido conjuntivo, numa tentativa de manter a integridade epitelial e formar uma barreira contra a penetração microbiana.

(D) O epitélio da bolsa está aderido à superfície dentária e encontra-se levemente infiltrado de leucócitos, predominantemente neutrófilos, que migram através do epitélio para o sulco gengival ou para a bolsa.

33) Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma característica da incisão cirúrgica de Partsch:

(A) concavidade para cervical.

(B) pode ser realizada em procedimentos que envolvam um a dois dentes.

(C) com um retalho semicircular de extensão limitada oferece acesso restrito.

(D) evita deslocamento das papilas.

34) Assinale a alternativa incorreta com relação à técnica radiográfica bite-wing:

(A) As radiografias interproximais são ótimas para avaliar o comportamento da lesão ao longo do tempo, pois são capazes de indicar se a lesão é ativa ou estacionada.

(B) As radiografias interproximais com a finalidade de acompanhamento de lesões devem ser padronizadas quanto à posição da tomada radiográfica, tempo de exposição e revelação dos filmes, e a sobreposição de dentes deve ser evitada.

(C) Lesões em esmalte em nível histológico não são detectáveis ao exame radiográfico. De acordo com a conduta do profissional, essa limitação pode ser boa ou ruim.

(D) A densidade radiográfica de uma lesão de carie irá variar de acordo com a espessura de esmalte, de dentina, com o tamanho, a forma e a localização da lesão.

35) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos traumatismos dentários, exceto:

(A) Em casos de fraturas radiculares na dentição decídua, as alternativas de tratamento incluem obrigatoriamente a extração do fragmento coronário e remoção do fragmento apical.

(B) Em casos de concussão, em função de que o ligamento periodontal estar inflamado, achados clínicos revelam uma sensibilidade à pressão e percussão, sem mobilidade, deslocamento ou sangramento no sulco. Anormalidades radiográficas não são esperadas.

(C) Em casos de replante de um dente avulsionado com necrose do ligamento periodontal suspeita-se que todo ou grande parte do ligamento periodontal esteja necrosado, sendo esperado que ocorra a anquilose dento alveolar e posterior reabsorção por substituição.

(D) O prognóstico em casos de subluxação normalmente é favorável. Os dentes maduros permanentes com ápices fechados podem

sofrer necrose pulpar devido à associação de lesões aos vasos sanguíneos no ápice e, desta forma, devem ser acompanhados cuidadosamente.

36) Assinale a alternativa incorreta com relação ao abscesso apical agudo:

- (A) O abscesso apical agudo é a causa mais comum de um abscesso dentário que é causado por infecção dos canais radiculares do dente por bactérias, principalmente anaeróbias, sendo as mais comuns: Streptococcus, Fusobacterium, Porphyromonas, Preponema e Prevotella.
- (B) A evolução do abscesso apical agudo é rápida, pois as manifestações clínicas estão envolvidas, não só com o dente como com os tecidos moles.
- (C) O aumento da mobilidade é enorme e a extrusão súbita e intensa, o que permite ao paciente sentir o dente muito alto em relação aos outros dentes em boca.
- (D) A dor é espontânea, contínua, intensa, pulsátil, localizada sendo amenizada com o calor local.

37) Assinale a alternativa incorreta com relação ao uso do MTA na proteção do complexo dentina polpa:

- (A) O MTA tem sua atividade antimicrobiana diretamente relacionada a doação de íons hidroxila, elevando o pH do ambiente.
- (B) O MTA apresenta elevada resistência mecânica.
- (C) Pode ser considerado biocompatível com o complexo dentina polpa.
- (D) Não pode ser usado em superfícies úmidas.

38) Assinale a alternativa incorreta com relação aos anestésicos orais e seus vasoconstritores:

- (A) O sal mepivacaína apresenta características semelhantes à lidocaína, porém, com efeito mais vasodilatador, permitindo uma anestesia menos duradoura quando sem vasoconstritor. O início de ação deste produto também é mais lento que os demais sais.
- (B) A prilocaína é metabolizada rapidamente pelo fígado, pulmões e rins, sendo considerada sistemicamente menos tóxica do que os outros anestésicos locais do tipo amida, de potência equivalente. Sua potência vasodilatadora é a menor, ao se comparar aos demais sais, permitindo a associação ao vasoconstritor Felipressina, com baixa potência vasoconstritora. Apresenta como reação

adversa a chamada metemoglobinemia que contraindica o seu uso a pacientes anêmicos.

(C) Vasoconstritor relativamente estável em soluções ácidas, a norepinefrina se deteriora quando exposta à luz, ao ar e a variações de temperatura ambiente, sendo este efeito minimizado com a presença de Metabissulfito de Sódio na formulação. Pode garantir vasoconstrição semelhante à da adrenalina.

(D) A Felipressina, também conhecida como Octapressin, é um vasoconstritor não-adrenérgico, análogo ao hormônio antidiurético. Seu potencial hemostático é bastante pobre. Sua atuação no miocárdio não é clinicamente observada, pela não atuação nos receptores adrenérgicos, tornando a Felipressina indicada para uso em cardiopatas.

39) “Recomendada para auxiliar outras técnicas ou em casos de tratamentos limitados, podendo ser realizada na maxila ou mandíbula. Seringas especiais foram desenvolvidas para permitir que a solução seja injetada do tubete sob pressão elevada, mas podemos utilizá-la com carpule convencional, tomando-se cuidado para não realizar pressão excessiva para não ocorrer quebra da agulha ou do tubete anestésico de vidro. Resultados mostram que pode haver extrusão de dentes, causada pela aplicação de pressão excessiva e, principalmente, grande quantidade exagerada de solução anestésica.”

Assinale a alternativa que apresenta o nome da técnica anestésica descrita acima:

- (A) Supraperiosteal.
- (B) Interpapilar.
- (C) Intraligamentar.
- (D) Intrapulpar.

40) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às resinas composta, exceto:

- (A) As resinas de macropartículas, praticamente não existem mais já que devido ao tamanho das partículas inorgânicas apresentavam lisura superficial insatisfatória.
- (B) As resinas microparticuladas apesar de apresentarem polimento excelente e são indicadas para aplicação de uma camada superficial nas restaurações estéticas dos dentes anteriores.
- (C) As resinas híbridas e microhíbridas, que representam o maior contingente de marcas comerciais, e segundo os fabricantes, apresentam indicação “universal”, podendo ser

associadas para a obtenção de melhores resultados.

(D) As resinas compactáveis são indicadas para cavidades ultraconservadoras e como forramento em restaurações de dentes posteriores com o intuito de funcionar como um amortecedor de choques devido ao baixo módulo de elasticidade.

41) “O momento em que os dentes irrompem e esfoliam pode sofrer aceleração ou atraso em decorrência de distúrbios orgânicos ou até mesmo devido a fatores pessoais e/ou ambientais que apesar de não influírem no equilíbrio fisiológico podem acarretar variações na cronologia eruptiva.”

Todas as alternativas abaixo apresentam alterações sistêmicas capazes de promover um retardo na erupção dos dentes, exceto:

- (A) hipotireoidismo.
- (B) síndrome de Down.
- (C) disostose cleidocranial.
- (D) síndrome de Noren.

42) “São considerados riscos ocupacionais a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda ou dano ocorra. Implica, pois, a probabilidade de ocorrência de um evento adverso.”

Assinale a alternativa abaixo que não apresenta um procedimento para minimizar o risco químico:

- (A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (luvas, máscaras, óculos e avental impermeável) adequados para o manuseio de produtos químicos desinfetantes.
- (B) Armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, conforme instruções do fabricante, para evitar acidentes.
- (C) Higienizar previamente a boca do paciente mediante escovação e/ou bochecho com antisséptico.
- (D) Acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável, de paredes rígidas, contendo água suficiente para cobri-los, e encaminhá-los para coleta especial de resíduos contaminados.

43) “Nos consultórios odontológicos, os profissionais podem lançar mão de procedimentos de localização radiográfica que, na quase totalidade dos casos, facilitam a determinação espacial do elemento dentário retido nas porções alveolares e contribuem para determinar os

procedimentos de acesso cirúrgico.”

Utilizando-se do princípio da paralaxe, o método de Johnson é indicado para:

- (A) localização de anomalias e processos patológicos na região do túber.
- (B) localização radiográfica de caninos superiores não irrompidos.
- (C) localização radiográfica de terceiros molares superiores não irrompidos.
- (D) determinação da expansão óssea vestibulolingual causada por processos patológicos na região do triângulo retromolar e ângulo mandibular.

44) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao tratamento restaurador atraumático, exceto:

- (A) Permite manutenção de estrutura dental sadia através da remoção seletiva de cárie com instrumentos manuais e restauração com Cimento de Ionômero de Vidro (CIV).
- (B) É considerada uma estratégia sólida baseada em promoção de saúde e prevenção da doença cárie, permitindo grande alcance populacional em saúde pública.
- (C) As principais falhas clínicas da utilização do TRA estão relacionadas com as propriedades dos materiais utilizados.
- (D) Reduz do número de exposições pulpares, reduzindo endodontias e exodontias, menor estresse e ansiedade do paciente, visto que raramente causa dor, não necessitando de anestesia.

45) Assinale a alternativa incorreta com relação a fluorose dentária:

- (A) A fluorose moderada e severa, caracterizada por manchas amarelas ou marrons, além de defeitos estruturais no esmalte, apresenta repercussões estéticas, morfológicas e funcionais.
- (B) O período crítico de exposição a dosagens excessivas de flúor para as duas dentições é do nascimento até oito anos de idade.
- (C) Aspectos biológicos individuais como baixo peso corporal, taxa de crescimento esquelético, períodos de remodelamento ósseo, estado nutricional, alterações da atividade renal e homeostase do cálcio não interferem na severidade da fluorose dentária.
- (D) Considera-se que o principal fator de risco associado à fluorose dentária é o aumento da ingestão média de fluoretos por meio de múltiplas fontes.

46) Assinale a alternativa incorreta com relação aos aspectos clínicos e histológicos da cárie aguda:

- (A) A cárie em dentina do tipo aguda, clinicamente, se apresenta com cor clara, variando de amarelo a castanho claro, com consistência macia, friável e como uma massa de aparência necrótica.
- (B) Nos casos de cárie aguda, a dentina esclerosada é formada devido a grave agressão ao complexo dentinopulpar.
- (C) Normalmente, mostra-se sensível aos doces, ao frio e aos ácidos, com um progresso rápido que normalmente expõe a polpa, pois a dentina sob a camada superficial é descalcificada.
- (D) As alterações no tecido dentário decorrentes da progressão da cárie aguda resultam em uma diminuição no valor do pH e um aumento na perda de mineral.

47) Assinale a alternativa abaixo que não apresenta um dos princípios da corticoterapia:

- (A) O corticóide deve ser usado no menor tempo e dose possível.
- (B) A dose antiinflamatória é 10x maior que a dose fisiológica e esta é 2x menor que a imunossupressora.
- (C) Exceto em alteração da adrenal o uso de corticóide é sempre com finalidade sintomática.
- (D) Uma dose, mesmo que pequena é virtualmente provida de efeitos colaterais.

48) Assinale a alternativa incorreta com relação aos antibióticos:

- (A) As cefalosporinas são consideradas eficazes em septicemias de causa desconhecida e profilaxia cirúrgica e, também, indicadas nos pacientes imunodeprimidos, sendo recomendadas para todas as faixas etárias.
- (B) Amoxicilina é utilizada na odontologia na prevenção de bacteremia associada a procedimentos como exodontias, em pacientes com risco de desenvolver endocardite bacteriana, sendo contraindicada para pacientes com hipersensibilidade a penicilina e a cefalosporina.
- (C) Apesar da sua grande eficácia como agente antimicrobiano, a Clindamicina raramente é utilizada devido a sua pobre absorção por via oral e seus fortes efeitos colaterais.
- (D) Qualquer tipo de penicilina quando desenvolve algum efeito colateral é sempre

de natureza leve e transitória, porém se qualquer reação de hipersensibilidade ocorrer, o tratamento deve ser interrompido imediatamente porque podem ocorrer reações alérgicas graves, anafilaxia, vasculite e nefrite intersticial.

49) “As ações de saúde bucal na estratégia de saúde da família devem expressar os princípios e as diretrizes do SUS e apresentar atribuições comuns aos Profissionais de Saúde Bucal no PSF.” Todas as alternativas abaixo apresentam algumas dessas atribuições, exceto:

- (A) Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas.
- (B) Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas de saúde da família.
- (C) Organizar o processo de trabalho de acordo com parcerias público-privadas estabelecidas pelo plano de saúde municipal.
- (D) Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal.

50) Todas as alternativas abaixo apresentam situações onde um antibiótico não deve ser prescrito, exceto:

- (A) dor de dente relacionada a pulpite irreversível, sem envolvimento sistêmico.
- (B) sintomatologia e-ou exsudação persistente após a conclusão de todas as medidas para controle da infecção intrarradicular.
- (C) necrose pulpar com envolvimento periapical sem envolvimento sistêmico.
- (D) abscesso periapical agudo confinados ao osso medular, e passível de drenagem via canal.